

Nettoyage de la plaie à l'eau du réseau et savon + serum physiologique.																LIVRET THERAPEUTIQUE PANSEMENT HAD SOINS ET SANTE	
A priori pas d'association des pansements avec: Dakin, eau oxygénée, eau stérile, alcool, Betadine. Dans tous les cas, l'utilisation d'antiseptique uniquement sur prescription et selon protocole. Prévention d'escarre par soulagement des points d'appui et effleurage.																	
Hydrocolloïdes		Hydrocellulaires	Hydrofibres	Alginate	Interfaces siliconées	Tulle gras / neutres	Hydrogels HYDRODETERSIF ABSORBANTS	Ac. Hyaluronique	Pansements charbon	Pansements bactériostatique		Pansements à l'argent <u>SUR PRESCRIPTION MEDICALE</u>	Pansements inhibiteurs enzymatique	Pansements absorbants et super absorbants			
INDICATIONS PLAIES CHRONIQUES																	
Fins	Epais	Plaie chronique et aigüe fibrineuse exsudative et bourgeonnante	Plaie fortement exsudative non hémorragique Plaie cavitaire	Plaie hémorragique moyennement à fortement exsudative, infectée ou non Plaie cavitaire	Plaie aigüe ou chronique (ulcères) Brûlure Plaie bourgeonnante		Facilite la détersion mécanique. Ramollis les plaques de nécroses. Hydrodétersion.	Ulcère Plaie chronique ou aigüe propre ou faiblement exsudative Brûlure	Plaie malodorante ou plaie cancéreuse	Mèche/compresse : Tout type de plaies. Traitement des mycoses sur prescription médicale	Sorbact gel : plaie sèche/nécrotique. Aide à la détersion mécanique.	Plaie infectée Uniquement sur prescription. utilisation à réévaluer régulièrement	Plaie sans fibrine, atone en phase de bourgeonnement. Après avis spécialisé	Plaie fortement exsudative			
Dermabrasion. Pansement primaire plaie peu exsudative. Pansement secondaire avec hydrogel.	Plaie modérément exsudative. Ulcère. Pansement secondaire avec hydrogel.																
INDICATIONS ESCARRES - 1ERE INTENTION : DECHARGER																	
Stade 1. Stade 3-4 en pansement secondaire avec hydrogel pour détersion	Stade 1. Stade 3-4 en pansement secondaire avec hydrogel pour détersion	Du bourgeonnement à l'épidermisation.	Du bourgeonnement à l'épidermisation	Stade 3-4 Escarre hémorragique Cicatrisation si exsudat	Phase de bourgeonnement et épidermisation peu exsudative		Stade 3-4	Non utilisé	Plaie malodorante	Stade 3-4 à risque d'infection		Escarre infectée	Non utilisé	Ulcère Escarre			
BON USAGE / LIMITES																	
Appliquer directement sur la plaie en dépassant des berges +3cm. Adhésion sur peau saine mais pas sur la plaie; retrait indolore. Gel formé malodorant pouvant couler hors du pansement et irriter la peau. Peuvent favoriser un hyper-bourgeonnement.	Pas d'adhérence à la plaie. Forte capacité d'absorption (x10). Ne se délite pas. Retrait indolore A découper et conformer pour pansement anatomique type talon : pas de forme spécifique au livret	Très forte capacité d'absorption (x30) transforme en gel au contact de la peau. Réduit la macération et protège la peau périlésionnelle. Nécessité d'un pansement 2ndaire	Forte capacité d'absorption (x15); capacité hémostatique. S'utilise toujours humidifié avec du serum physiologique à la pose. Humidifier le pansement lors du retrait avec eau du réseau ou sous la douche	Découpable, méchable. Recouvrir d'un pansement secondaire Retrait indolore.		Détersion mécanique nécessaire. Scarification de la nécrose avant application.	Cicatrisant Limite l'inflammation et l'envahissement bactérien. Réparation cellulaire. S'utilise sur une plaie propre sans fibrine ni nécrose	A utiliser comme pansement primaire ou secondaire. Ne jamais découper la compresse car risque de relarguage de charbon et coloration de la plaie.	Mécanisme physique de capture des bactéries/champignons. Sorbact absorbant = Sorbact compresse + pansement absorbant.	Sorbact gel doit être recouvert d'un film.	UNIQUEMENT SUR PRESCRIPTION MEDICALE LIMITEE A 15J Argent: action antibactérienne A n'utiliser qu'avec du chlorure de sodium	Inhibiteur enzymatique ayant pour objectif d'accélérer la cicatrisation	Capacité d'absorption. Peut etre utilisé en pansement tertiaire.				
				Aucune capacité d'absorption											Retrait indolore	Risque de sécher	Recouvrir d'un pansement secondaire. Ne pas associer à un pansement absorbant.
CONTRE-INDICATION																	
Plaie infectée, hyperbourgeonnante; mycoses		Plaie infectée. Plaie sèche.	Plaie sèche	Plaie non exsudative ou peu exsudative car risque d'adhésion	Plaie très exsudative	Plaie surinfectée	Plaie très exsudative ou infectée	Nécrose et fibrine		Action altérée par les corps gras		Allergie à l'argent	Plaie cancéreuse Plaie infectée	Plaie sèche			
FREQUENCE DE REFECTION DU PANSEMENT																	
A saturation/décollement ou max tous les 5j		A saturation; tous les 2 à 5 jours		Tous les 2-3 jours.		A saturation; max tous les 2j. Chaque jour si plaie infectée		Tous les jours	Tous les jours; max tous les 2j		Tous les jours jusqu'à détersion complète		Tous les jours		A saturation et selon pansement primaire		
LIVRET THERAPEUTIQUE																	
DUODERM EM adhésif 12.5x12.5 17.5x17.5	DUODERM E adhésif 10x10 15x15 20x20 DUODERM Signal Talon adhésif	AQUACEL FOAM adhésif 12.5x12.5 - 17.5x17.5 Petit sacrum 20x16,9 - Grand sacrum 24x21,5	AQUACEL EXTRA non adhésif 12,5x12,5 20x24 Mèche 2,5x40	KALTOSTAT Comp 7,5x12 Comp 10x20 mèche plate	ADAPTIC 10x10 12,7x22,9	JELONET Tulle 10x10 Tulle 10x40 Rouleau 15cmx2m	DUODERM hydrogel	IALUSET crème compresse 10x10	ASKINA CARBOSORB 10x10 10x20	SORBACT COMPRESSE 7x9 (pliée en 4) SORBACT MECHE 2x50	SORBACT COMPRESSE AVEC GEL 7,5x7,5	AQUACEL Argent 10x12 15x13,5 mèche 2,5x40 IALUSET PLUS compresse 10x10 crème FLAMMAZINE creme	URGOSTART BORDER 15x20	Pansement absorbant non adhésif type pansement américain 15x20 20x25	CONVAMAX 10x10 20x20		
		AQUACEL FOAM non adhésif Pour pose complexe 12.5x12.5 - 15x20		ALGOSTERIL SUR PRESCRIPTION MEDICALE NON SUBSTITUABLE POUR PLAIES PROFONDES ET HEMORRAGIQUES Comp 10x10 - 10x20 - Mèche plate 5x40 - Mèche ronde 2gx30cm (Reserve hospitalière)			HYDROCLEAN irrigo-absorbant : compresse 5,5x5,5 - 7,5x7,5 - 10x10 cavity 5,5 / 7,5 /10										
		Silicone: MEPILEX BORDER FLEX CARRE 7.5x8.5 - 12.5x12.5 - 17.5x17.5 MEPILEX BORDER FLEX OVAL 10x12,5 - 13,5x16,5 MEPILEX FLEX EXTRA MINCE 6x12 - 9x15 MEPILEX TRANSFER 12,5x12,5					URGOCLEAN Hydrodétersif absorbant mèche 5x40 Panst micro adh 10x10 et 15x20										
PANSEMENTS PRIMAIRES																	
OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	NON		
PANSEMENTS SECONDAIRES A ASSOCIER AVEC LE PANSEMENT PRIMAIRE																	
OUI	OUI	OUI	Compresse OU Hydrocellulaire	Compresse OU Hydrocellulaire	Compresse OU Absorbant	Operfilm Hydrocolloïde extra mince	Pansement sec type operfilm	Pansement simple OU Absorbant OU Adhésif	Compresse OU Hydrocellulaires OU Absorbant	Operfilm OU hydrocolloïdes extra mince	Jelonet Urgotul Pansement sec	NON	OUI	OUI			
PANSEMENTS SECONDAIRES INTERDITS																	
					Hydrocolloïde et films polymères	Absorbant et superabsorbant Alginate Hydrocellulaire Pansement sec Hydrocolloïde filmé	Hydrocolloïde film		Tulle gras Vaseline Interface siliconnée	Absorbant Alginate Hydrocolloïde épais Hydrocellulaire Super absorbant Sec	Hydrocolloïde Film polymère						
EQUIVALENTS																	
Comfeel Plus Suprasorb Ultac Pro Hydrocoll	Allevyn / lite Tielle / lite Askina Transorbent Biatain Hydrotac / confort Permafoam Urgotul lite Resposorb silicone Tegaderm foam	Biosorb Exufiber	Coalgan Askina Sorb Biatain Alginate Algiste M Urgosorb Suprasorb A	Urgotul Atrauman Hydrotul Mepitel Physiotulle	Tulle Gras Vaselitulle Cuticell Meditull	Intrasite Purillon gel Askina gel	Effidia	Carboflex Actisorb Carbonet			Mepilex Ag Biatain Ag Urgotul Ag Allevyn Ag		Pansement américain Zetuvit	Drymax Cutimed Mextra Resposorb Vliwasorb			

Pansement antiseptique: BETADINE Tulle 10x10 SUR PM
Pansement simple adhésif avec compresse stérile 5x7 - 15x9 - 20x9 (équivalent CICAPLAIE/COSMOPOR...)
Sparadrap non tissé : Urgoderm = Hypafix, Mefix
Bande extensible : Nylex ou Crêpe
Vaseline